



COMUNE DI NOCERA INFERIORE

COMMISSIONE SPECIALE SANITA'

Nocera Inferiore, 7 ottobre 2019

Al Sindaco
del Comune di Nocera Inferiore
Avv. Manlio Torquato

Preg.mo Sindaco

Con la presente invio una breve relazione sui dati che sono stati trasmessi al nostro Comune dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno in risposta alla nostra richiesta di conoscere incidenza e mortalità per malattie oncologiche nell'ambito del Comune di Nocera Inferiore.

I dati che ci sono stati trasmessi sono i dati ufficiali, ultimi disponibili. La fonte è il Registro Tumori dell'Asl Salerno, che fa parte della rete oncologica della Regione Campania. Essi **riguardano gli anni che vanno dal 2003 fino al 2012**. Tale registro istituito nel 1996 all'Ente Provincia di Salerno è parte integrante della Rete di Registrazione Oncologica della Regione Campania come da Legge Regionale numero 9 delle 25/2/2014.

I risultati su cui ci vogliamo soffermare sono quelli che riguardano il confronto tra **l'incidenza e la mortalità per malattie oncologiche nella nostra città rispetto all'incidenza e alla mortalità per tali malattie in tutta la Provincia di Salerno.**

Senza entrare in particolari statistici che possono essere letti direttamente sul rapporto dell'Asl che viene allegato alla presente, possiamo dedurre i seguenti punti, che riguardano i dati totali del decennio 2003-2012 e che dimostrano che rispetto alla provincia di Salerno i dati di Nocera e del Distretto 60 sono peggiori:

a) per quanto riguarda **l'incidenza nel decennio 2002-2013**, considerando uomini e donne in toto, si rileva **un rapporto standardizzato di incidenza (SIR) pari a 1.09**, superiore del 9% rispetto al SIR dell'intera Provincia di Salerno posto uguale a 1, per un totale di 2250 casi, il che si concretizza in 194 casi in più rispetto all'atteso (che era di 2056,82 casi), per l'intero distretto 60 il SIR è pari a 1,06, 6% in più rispetto all'intera provincia di Salerno;

- Gli **uomini** appaiono più colpiti delle **donne**, negli uomini l'incidenza è maggiore con un SIR di 1,16, che supera del 16% il SIR dell'intera provincia. Nelle donne per quanto riguarda l'incidenza il SIR è 1,05, un SIR che è superiore del 5% a quello dell'intera provincia;
- Negli uomini sono stati rilevati 1265 casi, mentre nelle donne 985 casi, in percentuale: maschi 56% e femmine 44%

Il TSD, cioè il tasso standardizzato diretto, in totale nei due sessi a Nocera Inferiore (544,89) è più alto rispetto a quello dell'intero distretto 60 (529,39), il quale è più alto rispetto a quello della provincia di Salerno (500,16) e più o meno ricalca i dati regionali e nazionale, ma quello che appare importante è che scorporando i dati

per i sessi, negli uomini abbiamo un TSD più elevato di quello nazionale 2014 (729 vs 607) mentre nelle donne il TSD si mantiene inferiore al dato nazionale 2014 (420 vs 513). (Fonte : i numeri del cancro in Italia, 2018)

In sostanza per quanto riguarda l'incidenza delle malattie oncologiche maligne a Nocera Inferiore i valori sono più elevati che nel Distretto 60, i quali sono più elevati che nell'intera provincia di Salerno.

b) **la mortalità nel decennio 2002-2013**, considerando uomini e donne in toto, presenta un **rapporto standardizzato di mortalità (SMR)** di 1,12, più elevato del 12% rispetto al **rapporto standardizzato di mortalità (SMR)** provinciale, per un totale di 1081 casi di morte per malattie oncologiche maligne a Nocera Inferiore nell'arco del decennio 2003-2012;

- Gli uomini appaiono più colpiti delle donne: la mortalità è stata maggiore rispetto a quella provinciale con un SMR pari a 1,18, aumentato del 18% rispetto a quello provinciale pari a 1, mentre nelle donne esso è stato di 1,10, superiore del 10% rispetto SMR della provincia posto uguale a 1;
- Nei maschi, nel periodo 2003-2012, sono deceduti per malattie oncologiche 638 persone mentre le donne sono state 442: maschi 59% e femmine 41%.

c) Nell'ambito dei diversi organi colpiti, la distribuzione evidenzia alcuni tipi di malattia oncologica che sono più frequenti come **incidenza** rispetto a tutta la provincia di Salerno:

- sono aumentati dal 10 fino al 20 % in più i seguenti tipi di cancro: encefalo e SNC, tessuti molli, mammella, vescica e oro-faringe

- aumentati dal 21 al 50% in più: mesotelioma, rene, prostata, occhio, linfoma non Hodgkin, esofago, laringe, Kaposi, leucemia mieloide cronica, ipofaringe

- aumentati più del 50% i tumori maligni di ghiandole salivari, altre ghiandole endocrine (esclusa tiroide), testicolo, altri genitali maschili (escluso testicolo) e altri genitali femminili (esclusi utero e ovaio).

Come numero di casi:

- negli uomini i tumori maligni più frequenti sono stati:
 - prostata, 230 casi (più 54 casi rispetto all'atteso, +31% di incidenza rispetto a quella dell'intera Provincia di Salerno)
 - polmone 216 casi (più 31 casi rispetto all'atteso, +17%)
- nelle donne i tumori maligni più frequenti sono:
 - mammella, 286 casi (più 35 casi rispetto all'atteso, +14% di incidenza rispetto a quella dell'intera Provincia di Salerno)
 - I tumori della pelle non comprendenti i melanomi con 116 casi, che però sono 20 casi in meno rispetto all'atteso,
 - tra quelli in cui l'incidenza nel nostro comune è superiore a quella dell'intera provincia ci sono i tumori del polmone con 52 casi e il linfoma non Hodgkin con 50 casi con incidenza superiore del 30% rispetto quella della provincia.

Ovviamente, per quanto riguarda le cause, essendo le malattie oncologiche a molteplici fattori, questi dati non indicano una causa in particolare però indicano certamente che nel nostro comune l'incidenza è maggiore che nel resto della provincia e così anche la

mortalità. Occorre perciò agire globalmente su tutte le cause che a livello scientifico sono riconosciute alla base di patologie oncologiche maligne, cercando di limitarne l'impatto sulla nostra salute lavorando risolverle ad una ad una.

L'obiettivo politico della salvaguardia dell'ambiente e dell'attenta sorveglianza amministrativa su questi temi si conferma fondamentale e trova nel nostro territorio, attraverso l'esame di questi dati dei motivi di forza per continuare le battaglie politiche dei prossimi anni.

Inoltre occorre informare la popolazione sulla validità degli screening e sui corretti stili di vita combattendo il fumo, l'alcol, l'obesità, la vita sedentaria, la cattiva alimentazione che tanto possono incidere nella prevenzione, e che sono tutte cose che possiamo fare già da adesso senza aspettare.

Distinti Saluti

Nocera Inferiore, 07.10.2019

dott. Vincenzo Stile

Presidente della

Commissione speciale Sanità

del Comune di Nocera Inferiore.

RTSA. COMUNE NOCERA INFERIORE vs PROVINCIA (escluso COMUNE di NOCERA INFERIORE) Anni 2003-2012.

Incidenza, mortalità a 10 anni. Sintesi dei risultati.									
SEDE	MASC HI					MORTALITA'			
	INCIDENZA		TSD	SIR	IC95%			SMR	IC95%
	Casi	Attesi				Casi	TSD		
Miscellanea	3	0,24	1,48	12,51	2.58-36.54	0,00	0,00	-	
Sarcoma di Kaposi	7	2,54	3,89	2,76	1.11-5.69	1,00	0,70	27,17	0.36-151.18
Mammella	5	2,62	3,30	1,91	0.62-4.46	2,00	0,94	1,55	0.19-5.58
Altri genitali maschili	1	0,55	0,56	1,82	0.02-10.11	0,00	0,00	-	
Testicolo	25	14,26	10,08	1,75	1.13-2.59	1,00	0,40	1,40	0.02-7.77
Altre ghiandole endocrine	3	1,79	1,41	1,68	0.35-4.89	3,00	1,70	3,05	0.63-8.92
Tessuti molli	10	6,24	4,78	1,60	0.77-2.95	4,00	2,09	2,29	0.62-5.87
Ipfaringe	2	1,26	1,09	1,58	0.19-5.72	1,00	0,56	1,54	0.02-8.58
Ghiandole salivari	4	2,57	2,39	1,56	0.42-3.99	2,00	1,04	2,04	0.25-7.38
Leucemia linfatica acuta	6	3,91	2,53	1,53	0.56-3.34	2,00	1,07	1,04	0.13-3.74
Altre MMPC e SMD	37	24,41	21,30	1,52	1.07-2.09	3,00	1,80	1,99	0.41-5.81
Occhio	2	1,42	0,88	1,41	0.17-5.1	0,00	0,00	-	
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	13	9,43	6,81	1,38	0.73-2.36	1,00	0,70	0,57	0.01-3.16
Pancreas	31	22,63	17,47	1,37	0.93-1.94	27,00	15,39	1,23	0.81-1.79
Orofaringe	4	2,94	2,03	1,36	0.37-3.49	0,00	0,00	-	
Linfoma di Hodgkin	12	8,93	5,23	1,34	0.69-2.35	0,00	0,00	-	
Mesotelioma	4	3,05	2,19	1,31	0.35-3.36	0,00	0,00	-	
Prostata	230	176,00	143,10	1,31	1.14-1.49	75,00	64,49	1,67	1.32-2.1
Labbro	3	2,35	2,63	1,28	0.26-3.74	0,00	0,00	-	
Laringe	34	26,50	19,33	1,28	0.89-1.79	19,00	12,38	1,72	1.04-2.69
Vescia (maligni)	119	93,70	71,38	1,27	1.05-1.52	38,00	25,99	1,05	0.74-1.44
Esofago	7	5,59	3,72	1,25	0.5-2.58	1,00	0,50	0,19	0-1.08
Tiroide	19	15,38	8,21	1,24	0.74-1.93	2,00	1,12	1,11	0.13-4
Linfoma non Hodgkin	48	39,98	25,33	1,20	0.89-1.59	22,00	13,57	1,55	0.97-2.34
Polmone	216	185,19	129,53	1,17	1.02-1.33	193,00	118,96	1,19	1.03-1.38
Altre vie urinarie	5	4,38	2,74	1,14	0.37-2.67	4,00	2,16	0,70	0.19-1.78
Leucemia mieloide cronica	5	4,38	2,58	1,14	0.37-2.66	1,00	0,63	0,52	0.01-2.87
Fegato	55	48,87	35,41	1,13	0.85-1.46	49,00	33,30	1,29	0.95-1.7
Colon	99	87,64	59,26	1,13	0.92-1.38	40,00	27,50	0,95	0.68-1.29
Rene	31	27,65	15,93	1,12	0.76-1.59	9,00	4,83	1,64	0.75-3.12
Mieloma	14	13,42	7,75	1,04	0.57-1.75	9,00	6,19	1,22	0.56-2.31
Encefalo e altro SNC (maligni)	22	21,07	10,48	1,04	0.65-1.58	17,00	9,73	0,91	0.53-1.46
Pelle, melanomi	20	19,48	9,73	1,03	0.63-1.59	5,00	3,44	0,86	0.28-2
Vie biliari	13	13,06	6,86	1,00	0.53-1.7	14,00	8,47	1,52	0.83-2.54
Stomaco	40	40,72	25,34	0,98	0.7-1.34	28,00	17,49	1,01	0.67-1.46
Faringe NAS	1	1,06	0,48	0,94	0.01-5.23	1,00	0,53	0,89	0.01-4.96
Pene	4	4,31	1,99	0,93	0.25-2.37	0,00	0,00	-	
(a) Pelle, non melanomi	144	163,69	86,28	0,88	0.74-1.04	1,00	1,37	0,51	0.01-2.86
Vescia (non maligni)	39	44,59	21,23	0,87	0.62-1.2	0,00	0,00	-	
Maldefinite e metastasi	14	16,07	7,84	0,87	0.48-1.46	28,00	17,70	1,06	0.7-1.53
Rinofaringe	3	3,64	1,52	0,82	0.17-2.41	0,00	0,00	-	
Leucemia mieloide acuta	8	10,20	3,86	0,78	0.34-1.55	6,00	4,11	1,07	0.39-2.33
Retto	32	43,72	16,28	0,73	0.5-1.03	6,00	3,22	0,56	0.2-1.21
Osso	2	3,08	0,84	0,65	0.08-2.34	4,00	2,00	1,64	0.44-4.19
Intestino tenue	2	3,17	1,06	0,63	0.08-2.28	0,00	0,00	-	
Bocca	2	3,40	1,02	0,59	0.07-2.12	1,00	0,48	0,62	0.01-3.45
Cavità nasale	1	1,85	0,40	0,54	0.01-3.01	1,00	0,56	1,67	0.02-9.27
Leucemia linfatica cronica	5	10,10	4,04	0,50	0.16-1.16	4,00	3,06	1,08	0.29-2.76
Altri organi toracici	1	2,57	0,56	0,39	0.01-2.16	7,00	3,52	1,90	0.76-3.91
Leucemie NAS	1	3,21	0,70	0,31	0-1.73	7,00	4,85	1,11	0.45-2.29
Lingua	1	3,71	0,50	0,27	0-1.5	0,00	0,00	-	
Totale	1409	1252,53	815,34	1,12	1.07-1.19	639,00	418,55	1,18	1.09-1.27
Totale escluso (a)	1265	1088,83	729,06	1,16	1.1-1.23	638,00	417,18	1,18	1.09-1.27
Totale escluso (a)(b)	1252	1079,40	722,25	1,16	1.1-1.23	637,00	416,48	1,18	1.09-1.27

RTSA. COMUNE NOCERA INFERIORE vs PROVINCIA (escluso COMUNE di NOCERA INFERIORE) Anni 2003-2012.

Incidenza, mortalità a 10 anni. Sintesi dei risultati.

SEDE	FEMMINE					MORTALITA'			
	INCIDENZA								
	Casi	Attesi	TSD	SIR	IC95%	Casi	TSD	SMR	IC95%
Labbro	0,00	0,88	-	-		0,00	0,00	-	
Orofaringe	0,00	0,36	-	-		0,00	0,00	-	
Rinofaringe	0,00	0,99	-	-		0,00	0,00	-	
Ipfaringe	0,00	0,05	-	-		0,00	0,00	-	
Faringe NAS	0,00	0,44	-	-		0,00	0,00	-	
Cavità nasale	0,00	0,81	-	-		0,00	0,00	-	
Sarcoma di Kaposi	0,00	2,31	-	-		0,00	0,00	-	
Miscellanea	0,00	0,60	-	-		0,00	0,00	-	
Leucemie NAS	0,00	2,89	-	-		7,00	2,99	1,08	0.43-2.22
Leucemia linfatica acuta	0,00	3,09	-	-		1,00	0,56	0,61	0.01-3.38
Laringe	8,00	2,26	3,49	3,54	1.53-6.99	2,00	0,93	3,53	0.43-12.73
Leucemia mieloide cronica	6,00	3,14	2,44	1,91	0.7-4.16	2,00	0,93	1,85	0.22-6.66
Altri genitali femminili	19,00	10,43	8,17	1,82	1.1-2.84	6,00	2,50	1,19	0.44-2.59
Esofago	3,00	1,75	1,25	1,71	0.35-5.01	4,00	1,75	2,51	0.67-6.42
Altre ghiandole endocrine	3,00	1,77	1,45	1,70	0.35-4.95	1,00	0,56	1,18	0.02-6.56
Ghiandole salivari	4,00	2,52	1,76	1,59	0.43-4.06	1,00	0,56	2,63	0.03-14.62
Lingua	4,00	2,52	1,68	1,59	0.43-4.06	1,00	0,40	1,38	0.02-7.7
Rene	20,00	13,40	8,54	1,49	0.91-2.3	4,00	1,63	1,28	0.34-3.28
Linfoma non Hodgkin	50,00	36,20	21,28	1,38	1.03-1.82	19,00	7,74	1,45	0.87-2.27
Polmone	52,00	39,43	21,86	1,32	0.98-1.73	47,00	19,93	1,46	1.08-1.95
Encefalo e altro SNC (maligni)	23,00	18,51	9,63	1,24	0.79-1.86	17,00	7,07	1,07	0.62-1.71
(b) Encefalo e altro SNC (non maligni)	25,00	20,91	10,60	1,20	0.77-1.76	5,00	1,95	2,97	0.96-6.92
Vie biliari	22,00	18,92	9,56	1,16	0.73-1.76	17,00	7,38	1,12	0.65-1.8
Mammella	286,00	251,08	122,49	1,14	1.01-1.28	85,00	37,48	1,16	0.93-1.44
Occhio	2,00	1,82	0,78	1,10	0.13-3.97	0,00	0,00	-	
Fegato	29,00	26,40	12,31	1,10	0.74-1.58	33,00	14,19	1,36	0.94-1.91
Mesotelioma	2,00	1,83	0,82	1,09	0.13-3.95	0,00	0,00	-	
Leucemia linfatica cronica	9,00	8,27	3,70	1,09	0.5-2.07	0,00	0,00	-	
Vescica (maligni)	21,00	19,22	9,09	1,09	0.68-1.67	6,00	2,55	0,75	0.27-1.63
Altre MMPC e SMD	21,00	19,61	8,91	1,07	0.66-1.64	0,00	0,00	-	
Stomaco	29,00	27,90	12,28	1,04	0.7-1.49	21,00	9,26	1,05	0.65-1.6
Colon	79,00	79,39	33,93	1,00	0.79-1.24	27,00	11,53	0,74	0.49-1.08
Utero, corpo	48,00	48,39	20,48	0,99	0.73-1.32	0,00	0,00	-	
Pelle, melanomi	25,00	25,33	10,53	0,99	0.64-1.46	5,00	2,11	1,02	0.33-2.39
Ovaio	34,00	36,19	14,37	0,94	0.65-1.31	20,00	8,60	0,99	0.6-1.53
Mal definite e metastasi	17,00	18,51	7,55	0,92	0.53-1.47	39,00	17,21	1,41	1.01-1.93
Retto	30,00	33,33	13,36	0,90	0.61-1.29	10,00	4,92	1,27	0.61-2.33
Utero NAS	5,00	5,69	2,22	0,88	0.28-2.05	14,00	6,36	0,84	0.46-1.4
(a) Pelle, non melanomi	116,00	136,65	50,72	0,85	0.7-1.02	0,00	0,00	-	
Pancreas	20,00	24,33	8,68	0,82	0.5-1.27	26,00	11,08	1,18	0.77-1.72
Utero, collo	14,00	17,36	5,78	0,81	0.44-1.35	2,00	0,86	1,06	0.13-3.83
Vescica (non maligni)	9,00	11,50	4,07	0,78	0.36-1.49	0,00	0,00	-	
Linfoma di Hodgkin	6,00	8,07	2,48	0,74	0.27-1.62	0,00	0,00	-	
Tiroide	38,00	52,91	15,75	0,72	0.51-0.99	3,00	1,38	0,90	0.19-2.64
Mieloma	10,00	14,20	4,18	0,70	0.34-1.3	9,00	3,81	1,11	0.51-2.1
Tessuti molli	3,00	4,86	1,46	0,62	0.13-1.8	2,00	0,85	1,22	0.15-4.4
Altre vie urinarie	1,00	1,70	0,42	0,59	0.01-3.28	2,00	1,01	0,87	0.11-3.14
Osso	1,00	1,97	0,40	0,51	0.01-2.82	0,00	0,00	-	
Altri organi toracici	1,00	2,19	0,56	0,46	0.01-2.54	2,00	0,93	0,80	0.1-2.9
Leucemia mieloide acuta	4,00	9,33	1,64	0,43	0.12-1.1	0,00	0,00	-	
Bocca	1,00	2,42	0,40	0,41	0.01-2.3	0,00	0,00	-	
Intestino tenue	1,00	2,51	0,42	0,40	0.01-2.22	2,00	1,00	2,76	0.33-9.96
Totale	1101,00	1077,15	471,46	1,02	0.96-1.08	442,00	192,04	1,10	1-1.21
Totale escluso (a)	985,00	940,49	420,74	1,05	0.98-1.11	442,00	192,04	1,10	1-1.21
Totale escluso (a)(b)	960,00	919,58	410,14	1,04	0.98-1.11	437,00	190,10	1,10	1-1.2

RTSA. COMUNE NOCERA INFERIORE vs PROVINCIA (escluso COMUNE di NOCERA INFERIORE) Anni 2003-2012.

Incidenza, mortalità a 10 anni. Sintesi dei risultati.

SEDE	MASCHI E FEMMINE					MORTALITA'			
	Casi	INCIDENZA Attesi	TSD	SIR	IC95%	Casi	TSD	SMR	IC95%
Miscellanea	3	0,83	0,67	3,62	0.75-10.59	0	0,00	-	
Altri genitali femminili	19	10,02	4,72	1,90	1.14-2.96	6	1,61	1,24	0.45-2.71
Altri genitali maschili	1	0,57	0,24	1,77	0.02-9.85	0	0,00	-	
Testicolo	25	14,22	5,00	1,76	1.14-2.6	1	0,19	1,37	0.02-7.63
Altre ghiandole endocrine	6	3,59	1,56	1,67	0.61-3.64	4	1,11	2,16	0.58-5.53
Ghiandole salivari	8	5,13	2,05	1,56	0.67-3.07	3	0,88	2,13	0.44-6.22
Ipfaringe	2	1,35	0,48	1,48	0.18-5.35	1	0,24	1,38	0.02-7.67
Leucemia mieloide cronica	11	7,61	2,52	1,45	0.72-2.59	3	0,89	0,96	0.2-2.81
Sarcoma di Kaposi	7	4,91	1,65	1,42	0.57-2.93	1	0,24	6,13	0.08-34.13
Laringe	42	29,91	10,41	1,40	1.01-1.9	21	5,54	1,72	1.06-2.63
Esofago	10	7,55	2,32	1,32	0.63-2.43	5	1,20	0,72	0.23-1.67
Altre MMPC e SMD	58	44,53	14,00	1,30	0.99-1.68	3	0,73	1,05	0.22-3.07
Linfoma non Hodgkin	98	76,62	23,51	1,28	1.04-1.56	41	10,04	1,49	1.07-2.02
(b) Encefalo e altro SNC (non mali	38	30,09	8,95	1,26	0.89-1.73	6	1,46	1,72	0.63-3.75
Occhio	4	3,25	0,89	1,23	0.33-3.15	0	0,00	-	
Prostata	230	186,55	57,79	1,23	1.08-1.4	75	21,92	1,54	1.21-1.93
Rene	51	41,73	12,05	1,22	0.91-1.61	13	3,08	1,48	0.79-2.53
Mesotelioma	6	4,94	1,45	1,21	0.44-2.64	0	0,00	-	
Orofaringe	4	3,38	0,91	1,19	0.32-3.03	0	0,00	-	
Vescica (maligni)	140	117,65	34,54	1,19	1-1.4	44	11,40	0,94	0.68-1.26
Mammella	291	247,25	68,68	1,18	1.05-1.32	87	21,91	1,21	0.97-1.49
Tessuti molli	13	11,18	3,07	1,16	0.62-1.99	6	1,40	1,75	0.64-3.81
Polmone	268	233,63	65,66	1,15	1.01-1.29	240	59,55	1,19	1.04-1.35
Encefalo e altro SNC (maligni)	45	39,84	10,34	1,13	0.82-1.51	34	8,09	0,97	0.67-1.36
Fegato	84	76,78	21,61	1,09	0.87-1.35	82	21,63	1,29	1.03-1.6
Vie biliari	35	31,98	8,90	1,09	0.76-1.52	31	8,08	1,28	0.87-1.81
Pancreas	51	47,22	12,52	1,08	0.8-1.42	53	13,20	1,19	0.89-1.56
Linfoma di Hodgkin	18	17,07	3,73	1,05	0.62-1.67	0	0,00	-	
Colon	178	168,94	44,44	1,05	0.9-1.22	67	17,75	0,84	0.65-1.07
Utero, corpo	48	46,92	11,24	1,02	0.75-1.36	0	0,00	-	
Pelle, melanomi	45	44,91	10,09	1,00	0.73-1.34	10	2,49	0,92	0.44-1.7
Stomaco	69	69,82	17,25	0,99	0.77-1.25	49	12,52	1,01	0.74-1.33
Ovaio	34	35,19	7,88	0,97	0.67-1.35	20	5,01	1,03	0.63-1.58
Altre vie urinarie	6	6,25	1,40	0,96	0.35-2.09	6	1,59	0,72	0.26-1.58
Utero NAS	5	5,52	1,32	0,91	0.29-2.12	14	3,83	0,87	0.47-1.46
Labbro	3	3,33	0,89	0,90	0.19-2.64	0	0,00	-	
Mal definite e metastasi	31	34,87	8,11	0,89	0.6-1.26	67	17,62	1,23	0.95-1.56
Pene	4	4,55	0,92	0,88	0.24-2.25	0	0,00	-	
Mieloma	24	27,79	5,71	0,86	0.55-1.29	18	4,67	1,15	0.68-1.82
Leucemia linfatica acuta	6	6,99	1,24	0,86	0.31-1.87	3	0,83	0,83	0.17-2.42
(a) Pelle, non melanomi	260	304,47	65,46	0,85	0.75-0.96	1	0,40	0,23	0-1.26
Tiroide	57	68,10	12,22	0,84	0.63-1.08	5	1,36	0,98	0.32-2.29
Vescica (non maligni)	48	58,10	11,49	0,83	0.61-1.1	0	0,00	-	
Utero, collo	14	16,96	3,10	0,83	0.45-1.39	2	0,48	1,10	0.13-3.96
Lingua	5	6,28	1,16	0,80	0.26-1.86	1	0,25	0,46	0.01-2.57
Retto	62	78,04	15,49	0,79	0.61-1.02	16	4,58	0,84	0.48-1.37
Leucemia linfatica cronica	14	18,55	3,50	0,75	0.41-1.27	4	1,12	0,55	0.15-1.41
Faringe NAS	1	1,52	0,23	0,66	0.01-3.65	1	0,24	0,66	0.01-3.69
Rinofaringe	3	4,70	0,70	0,64	0.13-1.87	0	0,00	-	
Leucemia mieloide acuta	12	19,73	2,66	0,61	0.31-1.06	6	1,55	0,53	0.19-1.15
Osso	3	5,09	0,63	0,59	0.12-1.72	4	0,92	0,93	0.25-2.39
Intestino tenue	3	5,72	0,67	0,52	0.11-1.53	2	0,64	1,28	0.16-4.64
Bocca	3	5,86	0,72	0,51	0.11-1.5	1	0,23	0,35	0-1.95
Altri organi toracici	2	4,81	0,64	0,42	0.05-1.5	9	2,27	1,44	0.66-2.73
Cavità nasale	1	2,73	0,19	0,37	0-2.04	1	0,24	1,08	0.01-6.03
Leucemie NAS	1	6,17	0,24	0,16	0-0.9	14	3,87	1,08	0.59-1.82
Totale	2510	2361,29	609,85	1,06	1.02-1.11	1081	278,87	1,12	1.05-1.19
Totale escluso (a)	2250	2056,82	544,39	1,09	1.05-1.14	1080	278,47	1,12	1.06-1.19
Totale escluso (a)(b)	2212	2026,73	535,44	1,09	1.05-1.14	1074	277,01	1,12	1.06-1.19